

Se estima que el 2,5 por ciento de la población mundial padece "ojo vago"

La detección precoz de la ambliopía, conocida también como "ojo perezoso o vago", resulta crucial para el tratamiento con éxito de esta enfermedad

LA VOZ
REDACCIÓN

La ambliopía es un problema visual, que también se conoce como "ojo perezoso o vago". Generalmente, afecta uno de los ojos, pero puede afectar a los dos. El problema comienza cuando las vías que transmiten los mensajes de la visión de uno de los ojos al cerebro no se desarrollan lo suficientemente fuertes. Entonces, el cerebro prefiere el otro ojo y la vista del niño no se desarrolla de manera normal.

La ambliopía es la causa más común de problemas de la vista en niños. Según las últimas investigaciones, aproximadamente un 2,5 por ciento de la población mundial sufre este problema. En España, existen aproximadamente un millón de casos.

¿A quién puede afectar?

Portadores de estrabismo de aparición temprana: la causa más frecuente de la ambliopía es la desalineación de los ojos o bizquera. Cuando los ojos de un niño no están alineados en forma apropiada, el cerebro no presta atención a un ojo para evitar la vista doble. Portadores de catarata: la ambliopía provocada por cataratas (opacidad en el tejido del ojo) es menos frecuente pero



LazyeyeTest.org
Screen your child for amblyopia (lazy-eye)
www.lazyeyetest.org

¿TIENE MI HIJO
AMBLIOPÍA
(OJO VAGO)?

■ Dirección de la web en la que se puede realizar el test para saber si se padece ambliopía.

más severa. Se debe tratar en los primeros 2 meses de vida.

Portadores de problemas de graduación elevados, principalmente los que combinan astigmatismo e hipermetropía: la ambliopía también puede producirse cuando un ojo ve mejor que el otro, por ejemplo, cuando uno de

los ojos es muy miope. Se usa el ojo más fuerte con más frecuencia que el ojo débil y, eventualmente, el ojo fuerte se hace cargo completamente y el ojo débil deja de trabajar. Portadores de importantes diferencias de graduación entre un ojo y el otro. Portadores de nistagmos, un tipo

de movimiento constante e involuntario de vaivén, de ambos ojos. Portadores de alguna lesión microscópica.

Ante cualquier duda, lo más recomendable es llevar al niño a un oftalmólogo especialista para una evaluación de los síntomas y su diagnóstico.



Dr. Fco. Sánchez - Waisen
UNIDAD OFTALMOLOGÍA
HOSPITAL VIRGEN DEL MAR
(Oftalmología Pediátrica)

¿Cómo detectar la Ambliopía (Ojo Vago)?

La **detección precoz** de la Ambliopía u Ojo Vago es crucial para el desarrollo del mismo.

Una **página Web** permite a los padres evaluar la visión de sus hijos y descartar que puedan tener ambliopía. La página:

www.lazyeyetest.org nos da acceso a una prueba validada que permite la detección de la causa más común de deficiencia visual en los niños.

Esta web fue presentada en la **Reunión Anual de la Academia Americana de Oftalmología de 2011**.

La prueba tiene una gran riqueza gráfica y mediante un lenguaje sencillo describe las pantallas y cómo interpretar los resultados. Por lo general, la prueba dura menos de **15 minutos** en ser completada.

Para el grupo de los niños de 3 a 5 años de edad, la sensibilidad de la prueba fue del 100% por lo que **constituye un método magnífico para la detección precoz** en el periodo más importante para el tratamiento con éxito de esta enfermedad.

